

Thông tin vaccin VAXXITEK HVT+IBD dành cho gà và liều trình sử dụng

Viết bởi Administrator

Thứ hai, 11 Tháng 4 2016 09:03 -

Vaccin dành cho gà có rất nhiều loại khác nhau về công dụng và cách sử dụng. Dưới đây là thông tin chi tiết cho vaccin VAXXITEK HVT+IBD có công dụng phòng bệnh Marek HVT và bệnh Gumboro trên gà



==> mua [gà con giống](#)

THÀNH PHẦN: Trong mỗi liều vaccine có chứa:

Virus tái tổ hợp Gumboro trên véc tơ Marek HVT, titer tối ưu: 3.880 PFU

Tá dược và chất bảo quản: 1 liều

CÔNG DỤNG: Vaccin sử dụng tái tổ hợp, phòng bệnh Marek HVT và bệnh Gumboro trên gà.

ĐIỀU KIỆN THUỐC:

Tiêm trứng gà có phôi 18 – 19 ngày ấp hay tiêm đường da cho gà 01 ngày tuổi (phần da trống phía sau cổ gà).

LIỀU DÙNG:

Tiêm trứng: pha 4.000 liều vaccin trong 200 ml nước pha và tiêm 0,05 ml / trứng có phôi.

Tiêm đường da gà 01 ngày tuổi, liều 0,2 ml / con.

Ampule 1.000 liều pha với 200 ml nước pha, tiêm cho 1.000 con gà.

Thông tin vacxin VAXXITEK HVT+IBD dành cho gà và liu trình sđ đng

Viết bởi Administrator

Thứ hai, 11 Tháng 4 2016 09:03 -

Ampule 2.000 liu pha vđi 400 ml nđc pha, tiêm cho 2.000 con gà.

Qui trình chuđn bđ vđc xin:

1. Chđ pha loãng vđc xin khi đđ trđc tiđp xem tđt cđ cđnh báo khi sđ đng.
2. Chđ lđy ampule khđi bình nitđ khi có yêu cđu sđ đng vđc xin. Lđy nhanh và cđn thđn.
3. Đđt ampule vào bđn nđc có nhiđt đđ +27oC đđ rđđ đông nhanh vđc xin. Rđđ đông vđc xin bên trong. Xoay nhđ ampule đđ vđc xin tđ phđn trên đng rđi hđt vào ampule. Bđ ampule tđi vđ trí cđ ampule và thđc hiđn nhanh chóng tiđn trình nhđ mô tđ sau đây:

Dùng túi nđc pha 200 ml / ampule 1.000 liu, túi nđc pha 400 ml / ampule 2.000 liu (dành cho tiêm đđđi da) hay túi nđc pha 200 ml / ampule 4.000 liu (dành cho tiêm trđng). Mđ bao túi nđc pha. Dùng đng tiêm 10 ml, kim 18-20; rút hđt vđc xin bên trong ampule. Cho vđc xin tđ tđ vào túi nđc pha tđđng đđđng. Rút mđt ít nđc pha, cho vào ampule đđ tráng lđi ampule mđt lđn nđa và cho ngđđc dung đđch này lđi túi nđc pha. Trđn đđu dung đđch vđc xin bđng cách đđo chỉđu nhđ nhđng túi dung đđch vđc xin.

Giđ túi vđc xin đđ pha loãng trong bình đá và tiêm phòng ngay sau khi pha loãng. Thđnh thđng đđo nhđ túi dung đđch vđc xin đđ đđm bđo dung đđch vđc xin đđng nhđt.

Cách tiêm trđng:

Trđđc khi bđt đđu tiêm trđng, đđc cđn thđn hđđng đđn máy tiêm trđng đđu khiđn thđ công. Nđu không thđc hiđn đđng hđđng đđn có thđ đđn đđn tại nđn cho kđ thuđt viên, trđng bđ tđn thđđng hay bđ chđt:

1. Làm vđ sinh hđ thđng tiêm trđng trđđc và sau khi sđ đng.
2. Tiêm liu 0, 05 ml / trđng có phđi.
3. Sđ đng hđt dung đđch vđc xin trong vòng 01 giđ sau khi pha loãng.

Cách tiêm đđđi da:

Vđ trùng đđng cđ tiêm bđng cách hđp autoclave tđi thiđu 15 phđt hay luđc ít nhđt 20 phđt.

Không cho bđt kđ hóa chđt sát trùng nào tiđp xúc vđi đđng cđ tiêm phòng.

1. Dùng đng tiêm tđ đđng vđi kim tiêm 20-22 và chđnh tđi vđch 0, 2 ml. Thđđng xuyên kiđm tra vđch 0, 2 ml trong quá trình tiêm.
2. Tiêm đđđi da cho gà con tđi vùng da lđng phía sau cđ gà. Dùng ngón tay cái và ngón trđ túm nhđ nhđng lđp da mđng lên và đđm kim vào hđđng vđ phía sau đđu. Tiêm 0, 2 ml / con. Tránh tiêm vào cđ hay xđđng gà.
3. Sđ đng hđt dung đđch vđc xin trong vòng 01 giđ sau khi pha loãng.

Cđnh báo vđi bình nitđ :

Phđi huđn luyđn cho ngđđi quđn lý bình nitđ.

Nitđ đđng là cđc lđnh. Tại nđn do tiđp xúc vđi da hay mđt sđ làm phđng lđnh nghiêm trđng. Bđo vđ mđt bđng kính che mđt. Mang gđng tay trong lúc lđy ampule hay nđp nitđ.

CHÚ Ý:

Không tiêm vđc xin cho trđng hđ hay gà bđnh.

Phđi tiêm đđng lođt cho tđt cđ trđng hay gà.

Phđi đđm bđo đđng liu.

THđI GIAN NGđNG Sđ ĐđNG THUđC: không

BđO QUđN:

Bđo quđn ampul vđc xin trong bình ni tđ đđng (-196oC)

Bđo quđn túi nđc pha đđ nhiđt đđ đđđi +25oC.

Bình nitđ: phđi chú ý đđn tđt cđ cđnh báo khi sđ đđng bình nitđ nhđ kính bđo hđ, gđng tay. Bđo quđn bình nitđ nđi thoáng mát. Kiđm tra mđc nitđ mđi ngày. Đđt bình tránh xa lò đđp và thùng gà. Không đđa ampule vđ phía mđt khi lđy ampule ra khđi bình nitđ. Không bao giđ làm đông lđnh

Thông tin vacxin VAXXITEK HVT+IBD dành cho gà và liú trình sđ đđng

Viét bđi Administrator

Thđ hai, 11 Tháng 4 2016 09:03 -

trđ đđi sau khi đđ rđ đđng.

Dđ NG BđO CHđ : đđng đđng đđ nh.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: ampul 2.000 liú u và túi nđđ c pha 400 ml đđi kèm.

Sđ N XUđ T đđ I: Merial Select, Inc. – Mđ

Sđ ĐẮNG KÝ: MRA-212

Nguđ n : Tđng hđp internet